



EL

Καθ. Βάρος: 35 g

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Εναιωρηματοποιησιμο κόκκοι (WG)



ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Δραστική ουσία:
Amrepolomyces quisqualis στέλεχος AQ10: 58,0 % β/β = 5 x 10⁹ CFU/γρ.
Βοηθητικές ουσίες: 42% β/β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο, περιέχει σπόρια του μύκητα *Amrepolomyces quisqualis* στέλεχος AQ10, ενός υπερπαρασπτικού μύκητα των ωιδίων. Με την εφαρμογή του σκευάσματος και την κατάλληλη υγρασία δημιουργούνται συνθήκες κατά τις οποίες ο μύκητας μειώνει την ανάπτυξη των ωιδίων μέσω του παρασιτισμού.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ - ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΥΑΑΤ): 60194/15.07.2008

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής, Στόχος, Δόσεις σκευάσματος, Τρόπος και χρόνος εφαρμογής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: **ΑΜΠΕΛΙ** (Επιτραπέζια σταφύλια): Ωίδιο. Δόση: 5-7 γρ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των συμπτωμάτων, από το στάδιο των διαγκωμένων ορθολομών έως και τη συγκομιδή. BBCH 03-99.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 12/7-10.

ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμα σταφύλια): Ωίδιο. Δόση: 3,5-7 γρ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των συμπτωμάτων, από το στάδιο των διαγκωμένων ορθολομών έως και τη συγκομιδή. BBCH 03-99.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 12/7-10.

ΣΟΛΑΝΟΔΗ (Υ+Θ):ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ: Ωίδιο. Δόση: 3,5-7 γρ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των συμπτωμάτων, από τον σχηματισμό των πλευρικών βλαστών έως ότου οι καρποί να είναι πλήρως ώριμοι. BBCH 21-89.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 4/7-10.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ ΜΕ ΒΡΩΣΙΜΟ ΦΛΟΙΟ (Υ+Θ): ΑΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ. Ωίδιο. Δόση: 3,5-7 γρ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των

συμπτωμάτων, από την έκπτυξη του βού πραγματικού φύλλου έως ότου οι καρποί να είναι πλήρως ώριμοι. BBCH 16-89.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 4/7-10.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ ΜΕ ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΟ ΦΛΟΙΟ (Υ+Θ): ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ: Ωίδιο. Δόση: 3,5-7 γρ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του 1ου άνθους έως ότου ο βού καρπός στο κύριο στέλεχος να έχει το τυπικό του μέγεθος. BBCH 52-78.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 4/7-10.

ΦΡΑΟΥΛΙΑ (Υ+Θ): Ωίδιο. Δόση: 3,5-7 γρ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των συμπτωμάτων, από την έκπτυξη του 4ου πραγματικού φύλλου έως και τη 2η συγκομιδή, όταν οι περισσότεροι καρποί έχουν το τυπικό τους χρώμα. BBCH 14-89.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 4/7-10.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Υ+Θ): Ωίδιο. Δόση: 3,5-7 γρ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση των συμπτωμάτων, από την ανάπτυξη του κύριου βλαστού έως την πλήρη άνθηση, όταν τουλάχιστον το 50% των ανθέων είναι ανοιχτά. BBCH 40-65.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 4/7-10.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος μεταβάλλεται ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
- Οι υψηλότερες δοσολογίες συνιστώνται όταν η πίεση του μολυσματος είναι μεγάλη ή σε φυτά με μεγάλη φυλλική επιφάνεια.
- Είναι αναγκαίες τουλάχιστον δύο διαδοχικές εφαρμογές σε απόσταση 7-10 ημερών ώστε να μπορέσει ο μύκητας *Amrepolomyces quisqualis* να εγκατασταθεί στην καλλιέργεια.
- Το σκεύασμα μπορεί να εφαρμοστεί στο αμπέλι καθ' όλη τη βλαστική περίοδο με μέγιστο αριθμό 12 επιμβάσεων το χρόνο και είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται στην έναρξη της προσβολής (προσβολή < 3%). Όταν υπάρχει βροχόπτωση άνω των 60mm συνιστάται επανάληψη.
- Για τα κηπευτικά οι χαμηλές δόσεις είναι προληπτικές ενώ οι υψηλές δόσεις είναι

θεραπευτικές.

6. Το σκεύασμα πρέπει να ψεκάζεται νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν η υγρασία είναι υψηλή για να μπορέσει γρήγορα ο μύκητας να εγκατασταθεί στην καλλιέργεια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Σταφύλια (επιτραπέζια, οινοποιήσιμα), Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Κολοκυθά, Πεπόνι, Καρπούζι, Φράουλα, Τριαντάφυλλα –.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκασμό από το φύλλωμα, πλήρους κάλυψης. Χρησιμοποιούνται μηχανοκίνητα ψεκαστικά ή επινώπια ψεκαστήρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Συνιστάται να προηγηθεί διάλυση της απαιτούμενης ποσότητας AQ 10 σε 1 – 2 λίτρα νερού. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο κατά το ήμισυ με νερό. Προσθέστε την προδιαλεγμένη ποσότητα του προϊόντος και συμπληρώστε το δοχείο με νερό υπό συνεχή ανάδευση. Το εναιώρημα παραμένει για 10 – 12 ώρες μέχρι την εφαρμογή του. Κατά την εφαρμογή του συνιστάται συνεχής ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό & απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με σύστημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Διαχείριση ανθεκτικότητας. Το σκεύασμα περιέχει τον μικροοργανισμό *Amrepolomyces quisqualis* στέλεχος AQ10. Δεν αναμένεται κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

- ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΣΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να μην εισέρχεται πριν να έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φύλλα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: Περιέχει *Amrepolomyces quisqualis* στέλεχος AQ10. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φοράστε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Μην αναπνέετε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού.
- Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο κατά την ανάμιξη, φάρωση κι εφαρμογή του σκευάσματος»

«Σε περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακριμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια»

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν ανοσοανεπάρκεια ή διατελούν υπό θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες.

- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

• Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για αρκετά λεπτά. Ζητείστε ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός επιμένει.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε την περιοχή που έχει έλθει σε επαφή με το προϊόν με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον πάσχοντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν έχει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον σταθερά σε πλάγια θέση για μεταφορά.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Χορηγήστε άφθονο νερό για αραιώση του προϊόντος. Μην προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε άμεσα γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Στην αρχική απαριθίαση συσκευασίας του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία υψηλότερη των 30°C για διάστημα μεγαλύτερο από 18 εβδομάδες και σε θερμοκρασία υψηλότερη των 20°C για διάστημα μεγαλύτερο από 1 έτος. Σε θερμοκρασίες 4°C – 6°C παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΑΡΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Αναγράφονται πάνω στη συσκευασία

Καθ. Βάρος: 35g

Κάτοχος της άδειας:

CBC (Europe) S.r.l

via Zanica 25

24050 Grassobbio (BG), Ιταλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.

Κέκροπος 62 & Κονίτσας 38,

151 25 Μαρούσι,

Τηλ. 210-6460700