

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

- Περιέχει *Aureobasidium pullulans*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 - «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν **ανοσοανεπάρκεια** ή διατελούν υπό θεραπεία με **ανοσοκατασταλτικούς** παράγοντες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 - Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα.
 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο.
 - Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
 - Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 - ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
- Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
- Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών στις καλλιέργειες: **αμπέλι και τομάτα**, να αφήνετε ασφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** ή ασφέκαστη ζώνη προστασίας **3 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσιών μείωσης της διασποράς κατά 50%**.
 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
 - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/ Επισκεφτείτε γιατρό.
 - Σε περίπτωση εισπνοής: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 - Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Αναγράφονται πάνω στη συσκευασία

BOTECTOR® (Μποτέκτορ)

Μυκητοκτόνο

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ :

Δραστική ουσία: *Aureobasidium pullulans* DSM 14941: 2.5*10⁹
έως 2.5*10¹⁰ cells/g ή 50 έως 500 g/Kg
Aureobasidium pullulans DSM 14940: 2.5*10⁹
έως 2.5*10¹⁰ cells/g ή 50 έως 500 g/Kg

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ - ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (YAAT): 61096/06-12-2022

Κάτοχος της άδειας:

SAN Agrow Holding GmbH
Industriestraße 21, 3130
Herzogenburg, Αυστρία
Τηλ.: +43 2782 83300
e-mail: sanagrow-at@san-group.com

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Κηφισίας 18,
115 26 Αθήνα, τηλ. 210-6460700

**Καθ. Βάρος:
1 kg**

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

9502423071026

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Μυκητοκτόνο με προληπτική δράση για την καταπολέμηση του Βοτρύτη (Botrytis cinerea) στις καλλιέργειες αμπέλου, φράουλας και τομάτας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής, Στόχος, Δόσεις σκευάσματος, Τρόπος και χρόνος εφαρμογής, Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:

ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιες και Οινοποιήσιμες ποικιλίες): ΒΟΤΡΥΤΗΣ Δόση: 40 -100¹ γρ/στρέμμα, Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμμα. Από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των ραγών. (Άνοιξη-Φθινόπωρο) BBCH 68-89.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4

ΦΡΑΟΥΛΑ Υπαίθρου: ΒΟΤΡΥΤΗΣ Δόση: 70 -100 γρ/στρέμμα, Όγκος ψεκ. υγρού: 60-200 λίτρα/στρέμμα.

Από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 61-89

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6

ΣΟΛΑΝΩΔΗ Υπαίθρου: ΤΟΜΑΤΑ: ΒΟΤΡΥΤΗΣ Δόση: 50 -100 γρ/στρέμμα, Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Από την άνθηση μέχρι και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-89

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στο Αμπέλι εφαρμόστε την ελάχιστη δόση (40 γρ./στρέμμα) για εφαρμογή μόνο σε σταφύλια. Εφαρμόστε τη μεγαλύτερη δόση (100 γρ./στρέμμα) για εφαρμογή σε όλο το πρέμνο.

2. Το σκεύασμα έχει μέτρια αποτελεσματικότητα η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι, Τομάτα,

Φράουλα: - - -

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Διαφυλικοί ψεκασμοί καλύψεως.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε τα 2/3 του δοχείου του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος BOTECTOR στο ψεκαστικό δοχείο με συνεχή ανάδευση και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.

Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι μικρότερη των 25° C. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύνετε τα πολλές φορές, ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό/βυτίο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Είναι προτιμότερο οι εφαρμογές να γίνονται το απόγευμα.

Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι μικρότερη των 25° C.

Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών.

Το μίγμα πρέπει να αναδεύεται κατά την εφαρμογή του.

Μην αφήνετε κατάλοιπα στο ψεκαστικό δοχείο.

Για την καταπολέμηση του Βοτρύτη, η χρήση άλλων μη συνδυαζόμενων μυκητοκτόνων σκευασμάτων πρέπει να απέχει 3 ημέρες από την εφαρμογή με το Botector.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντόμων στο BOTECTOR είναι χαμηλός.

Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή του σκευάσματος με εντομοκτόνα από διαφορετικές χημικές ομάδες και που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, εναλλαγή καλλιεργειών και εφαρμογή ορθής γεωργικής πρακτικής.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ: -ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Να μην εισέρχεστε στο θερμοκήπιο μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Διατηρείστε το μόνο στην αρχική του συσκευασία. Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Αποθηκεύσατε σε ερμητικά κλειστή συσκευασία σε ψυχρό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Σταθερότητα Αποθήκευσης:

- 18 μήνες σε θερμοκρασία 20°C,
- 30 μήνες σε θερμοκρασία 8°C.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
 - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/ Επισκεφτείτε γιατρό.
 - Σε περίπτωση εισπνοής: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 - Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μεταφέρετε τον παθόντα από την επικίνδυνη ζώνη, σε καλά αεριζόμενο χώρο ή στον καθαρό αέρα και προσπατήστε τον από την υποθερμία.
- Σε περίπτωση κατάποσης:** Πλύνετε το στόμα με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε τα κρατώντας τα ανοικτά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777