

BIOSOL®

DER BIOLOGISCHE WEG ZU BESSEREM ERTRAG
THE ECOLOGICAL WAY TO HIGHER YIELDS

OMRI®
Listed

gelistet
InfoXgen®
für Biobetriebe geeignet

EU-Bio
VO 834/2007
geeignet für den biologischen Landbau gemäß EU - VO 889 / 2008, Anhang I

ORGANISCHER DÜNGER • ORGANIC FERTILIZER




1285



PE-LD



LDPE



25 KG

BIOSOL®

Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, 6250 Kundl/ Österreich;
Erzeugungsland Österreich

Einzelgenehmigt als organisches Düngemittel nach §9a DMG 1994

Zusammensetzung:
85 % organische Substanz
6-8 % N- Stickstoff gesamt
0,5 % P₂O₅ – Phosphat gesamt
0,3 % K₂O – Kaliumoxid gesamt

Streufähiges Granulat ohne Zusatz von Nährstoffen, das bei der Penicillinherstellung als Nebenprodukt anfällt. In der Aufwandsbemessung sind die jeweils gültigen Richtlinien für die sachgerechte Düngung des Fachbereichs für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz beim BMLFUW zu beachten. Auflagen des Wasserrechtsgesetzes beachten.
Bitte beachten Sie die Höchstgrenze von 170 kgN/ha im biologischen Landbau.

Kultur oder Anwendung	Düngermenge	Ausbringungszeitraum
Weinbau	500-700 kg/ha	Frühjahr oder Herbst
Hölsenfrüchte	500-1.000 kg/ha	vor Anbau
Getreide	500-800 kg/ha	vor Anbau
Mais	1.300-1.600 kg/ha	vor Anbau
Kartoffeln	1.000-1.500 kg/ha	vor Anbau
Futterrüben	1.200-1.500 kg/ha	vor Anbau
Zuckerrüben	800-1.300 kg/ha	vor Anbau
Sonnenblumen	600-800 kg/ha	vor Anbau
Kürbis	600-800 kg/ha	vor Anbau
Hopfen	1.100-1.500 kg/ha	Frühjahr oder Herbst
Kornerspross	500-600 kg/ha	Frühjahr oder Herbst
Obst-Junganlage	700-900 kg/ha	Spätherbst oder Frühjahr
Obst-Ertragsanlage	600-800 kg/ha	Spätherbst oder Frühjahr
Beerensträucher	700-900 kg/ha	Frühjahr
Erbsenart	900-1.200 kg/ha	vor Anbau oder Frühjahr
Tomaten, Paprika	800-1.200 kg/ha	vor Anbau
Wiesen, Weiden: Neusaat	1.500 kg/ha	bei Ansaat
Wiesen, Weiden: Düngung	800-1.000 kg/ha	Vegetationsperiode
Almen	600-800 kg/ha	Vegetationsperiode
Skipisten	1.200-1.700 kg/ha	Vegetationsperiode
Forst-Jungkulturen im Freiland	100-150 g/Pflanze	Vegetationsperiode
Forst-Bestandsdüngung	2.000-2.500 kg/ha	Vegetationsperiode
Forstpflanzen im Pflanzgarten	1.000-1.500 kg/ha	Frühjahr
Ziergehölze, Ziersträucher	200 g/m ²	Frühjahr
Kompostbereitung	5-10 kg/m ²	gemäßig
Zier- und Balkonpflanzen	4-6 kg/m ²	Vegetationsperiode

Kultur oder Anwendung / Anwendungshinweise:
Generell wird eine oberflächliche Ausbringung empfohlen, wobei der Dünger auch oberfläch-lich (einige cm) eingearbeitet werden kann. Besonders bei Anpflanzungen und Aufforstungen ist darauf zu achten, dass der Dünger nur oberflächlich ausgebracht wird. Bei Jungpflanzen sollte der Dünger 2 Wochen vor der Anpflanzung ausgebracht werden. Wenn direkt zur Pflanzung gedüngt wird, muß ein entsprechender Abstand (ca. 5 cm) zur Pflanze eingehalten werden. Für die meisten Kulturen reicht eine Düngergabe je Vegetationsperiode.
Nur Intensivkulturen (Gemüse, Zierpflanzen) erfordern teilweise eine Nachdüngung mit reduzierten Mengen. Verpacktes Produkt vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen!
Für mehr Information: www.biosol.com

Hersteller:Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10
A-6250 Kundl, Austria

BIOSOL®: Organischer NPK-Dünger 7+0,5+0,3 Fermentationsrückstände pflanzlicher Herkunft aus der Arzneimittelproduktion; Thermisch behandelt

6 - 8 % N Gesamtstickstoff
0,5 % P₂O₅ Gesamphosphat
0,3 % K₂O Gesamtkalium

Nettomasse: 25 kg Ausgangsstoffe: 100 % Fermentationsrückstände pflanzlicher Herkunft (Pilzmycel des *Penicillium chrysogenum*)

Nebenbestandteile:
0,1 % Mg Magnesium
0,7 % Na Natrium
1,5 % S Schwefel
Chlordarm Chloridgehalt unter 2 %
85 % organische Substanz
pH-Wert CaCl2 3,5

Lagerungshinweise: Trocken lagern. Eine Lagerung und Ausbringung darf nur so erfolgen, dass es nicht zu Abtragungen in Oberflächengewässer oder Grundwasser kommen kann. Durch längere Lagerung können sich die Nährstoffgehalte geringfügig ändern.
Anwendungshinweise: Zur Bodenverbesserung und Düngung. Die erreichbaren Nährstoffgehalte im Anwendungsjahr betragen für Stickstoff ca. 70-80 % für Phosphat 30-35 % und für Kalium 70-80 % Für alle Kulturen geeignet. Es ist darauf zu achten, dass der Dünger nur oberfläch-lich ausgebracht wird. Bei Jungpflanzen sollte der Dünger ca. zwei Wochen vor der Anpflanzung ausgebracht werden. Die Empfehlungen der amtlichen Beratung sind vorrangig zu beachten.

Vertrieb Deutschland: SW Düngetechnik GmbH, Am Exer 10b,
D-38302 Wallenbühl, Tel.: 05331/903112

Producer: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl
Made in Austria

BIOSOL® Organic Fertilizer, registered in Austria § 9a DMG 1994, plant origin

Guaranteed analysis:
85 % organic substance
6 - 8 % N Nitrogen total
0,5 % P₂O₅ Phosphorous total
0,3 % K₂O Potassium total

BIOSOL is allowed to use in organic farming and certificated by Austria-Bio-Garantie (AT-BIO-301) and OMRI.

Vegetation or plant type	annual appl.	recommended time
vineyards	500-700 kg/ha	spring through fall
garden preparation	200 g/m ²	spring through fall
corn	1.300-1.600 kg/ha	prior to cultivation
sugar beets	1300-1600 kg/ha	prior to cultivation
fruit plantation	700-900 kg/ha	spring or fall
meadows, pastures	800-1300 kg/ha	while vegetation period
young forest plants/trees in nursery	1200-1500 kg/ha	spring or fall
ornamental trees or shrubs	200 g m ²	spring
lawns and playing fields	1.000-1.600 kg/ha	while vegetation period
berry shrubs	700-900 kg/ha	spring
reclamation (road banks, mines)	500 -600 kg/ha	while vegetation period
maintenance-fertilization/reclam.	800-1.500 kg/ha	while vegetation period

Granulated Biosol can be spread by hand, mechanically or by helicopter. Biosol is applied only on the soil surface. In special cases a low depth working in (1-3 cm) can be of advantage. Using for young plants, the fertilizer should be sowed out at least 2 weeks before planting. Or fertilizing after planting means there should be a gap of 5 cm between young plant and fertilizer. Keep packing dry and protect from ultraviolet radiation.
For more information: www.biosol.com

Proizvajal: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria
Distributer za Slovenijo: Simplit d.o.o., Selo 11a, 5262 Črniče, Slovenija

Organsko gnojilo rastlinskega izvora v obliki granulata zrnate oblike.

Setava:
N Dušik (ukupno) 6 - 8 %
P₂O₅ Fosfor (P₂O₅) 0,5 %
K₂O Kalij (K₂O) 0,3 %
Organska snov 85 %
C/N razmerje 6:1

Priporočena uporaba in podrobnejše informacije www.simplitgreen.si

Vsebina 25 kg

Produzione e vendita: Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl AUSTRIA

BIOSOL®
CONCIME ORGANICO NP
Biomasse da miceli
Azoto (N) organico 6 %
Anidride fosforica (P₂O₅) totale 1 %
Peso netto 25 kg

Παρασκευαστής: SANDOZ GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl Tirol, AUSTRIA
BIOGARD GRÉÈCE ΕΠ.Ε.:
Κέρκυρας 62 & Κωνσταντ. 38, 161 25 Μαρασσί, Τηλ: 210 6460700, www.biogard.gr
PROVIROM LTD.: ΓΕΩΗ ΒΑΡΥΜΑΤΙΣ ΑΣΤΙΡΟΥΤΥΡΟΣ 19300 ΑΤΤΙΚΗ ΘΛΑ 2105584089
www.provirom.com

BIOSOL (ΑΓΡΟΦΟ ΜΠΟΙΟΣΟΛ) 6 – 0,5 – 0,5

NEOY TITIOY ΛΙΠΑΤΑΜΑ ΑΡΓΗΣ ΑΠΟΛΕΜΕΥΣΗΣ

Ομάδα B: Οργανικά λιπάσματα κύριων και δευτερευόντων στοιχείων με ή χωρίς χηνοστοχεία.

Το BIOSOL είναι ένα φυσικό, ασφαλή περιβαλλοντικό λίπασμα, με υψηλή συγκέντρωση οργανικής ουσίας. Είναι λίπασμα μακρής δράσης και υψηλής απόδοσης.
Το BIOSOL αποδοσιμεί επίσης τα υπάρχοντα απόβλητα καλίου και φωσφόρου στο έδαφος.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

ΟΛΙΚΟ ΑΖΟΤΟ (N): 6 %
ΟΞΕΛΙΩ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (K₂O): 0,50 %
ΟΞΕΛΙΩ ΟΥΧΙΑ: 85 %
ΦΟΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P₂O₅): 0,50 %

Το BIOSOL είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. [ΕΕ] 2021/1165 και Καν. [ΕΕ] 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

- Το BIOSOL ενσωματώνει τους υψηλόμενους μικροοργανισμούς στο έδαφος.
- Το BIOSOL μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στη βιολογική όσο και στην επανοσκή λίπασμα στις συνιστώμενες δόσεις.

- Το BIOSOL στην επεξεργασία λίπασμα των κτηνικών πρέπει να εφαρμόζεται πάντα σε απόσταση 5 εκ. από τον κορμό των τεσσάρων φυτών. Στις μεγάλες καλλιέργειες μπορεί να εφαρμόζεται και στα σάκελα, αλλά να να σκεπάζεται με λίπασματοδυναμικά. Καθαρό δίκτυο του προϊόντος μπορεί να εφαρμοστεί και μετά από τη σκληρή αφαίμαξη, πάντα σύμφωνα με την οδηγία του τοπικού αντιπροσώπου.
Ο έδαφος φέρωντας ένα εδαφικό και προσομοιώνοντας κάθε περίπτωση με βάση τον τύπο του εδάφους, τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας και την τοπική κατάσταση. Στη συνέχεια, μπορεί να συνδυαστεί με οικολογικές μεθόδους χημικών λιπασμάτων.

Συνθήκες αποθήκευσης: Τα σάκελα αποθηκεύονται σε δροσερό και ξηρό χώρο.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καλλιμαστική άδη (υποβάρη ή θερμική)	80-120 kg/στρέμμα	Η εφαρμογή γίνεται ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας, σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών γεωπόνων και βάσει της ορθής γεωργικής πρακτικής
Αμπέλι	50-70 kg/στρέμμα	
Δημητριακά	50-80 kg/στρέμμα ή 10-15 kg/στρέμμα σε συνδυασμό με χημικά λιπάσματα	
Δενδρώματα	70-100 kg/στρέμμα	
Ελιά	70-100 kg/στρέμμα	
Επιτραπέζια, Ακτινίδια	70-100 kg/στρέμμα	
Κινηματά λαχανικά	60-80 kg/στρέμμα	
Βαμβάκι, Τριφύλλι	15-30 kg/στρέμμα	
Καπνό	40-60 kg/στρέμμα	
Πατάτα, Κρεμμύδι	30-60 kg/στρέμμα	
Γκαζόν	60-120 kg/στρέμμα	
Φυτωρύατα	4-6 kg/m ² εδαφικό υποστρώματος	
Αριθ. κυκλοφορίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: 14, 49		

Hersteller: Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10,
6250 Kundl/Österreich

Vertrieb in der Schweiz: SoilCare GmbH, Im Feld 14, 8486 Rikon im Tössal

BIOSOL ®
Stickstoffbetonter Recyclingdünger aus Pilzmycel NPK (6-0,5-0,3)

Gemüse F&B-Hilfsstoffe für den biologischen Landbau zugelassen
Ordnungsnummer BLW 3252

Zusammensetzung:
85 % organische Substanz
6-8 % N- Stickstoff gesamt
0,5 % P₂O₅ – Phosphat
0,3 % K₂O – Kaliumoxid

Netto 25 kg e Granulat.

Anwendungshinweise:

Die Düngungsempfehlungen der eidgenössischen landwirtschaftlichen Forschungsanstalten sind zu beachten. Generell wird eine oberflächliche Ausbringung empfohlen, wobei der Dünger auch oberflächlich (einige cm) eingearbeitet werden kann. Besonders bei Anpflanzungen ist darauf zu achten, dass der Dünger nur oberflächlich ausgebracht wird. Bei Jungpflanzen sollte der Dünger 2 Wochen vor der Anpflanzung ausgebracht werden. Wenn direkt zur Jungpflanze gedüngt wird, ist ein entsprechender Abstand (ca. 5 cm) zur Pflanze einzuhalten. Für die meisten Kulturen reicht eine Düngergabe je Vegetationsperiode mit reduzierten Mengen.

Hinweise zum Schutz der Umwelt und Kulturen:

Dieses Erzeugnis kann bei nicht fachgerechter Anwendung die Fruchtbarkeit des Bodens gefährden, den Zustand der Gewässer und der Luft beeinträchtigen oder die Qualität der Pflanzen nachteilig beeinflussen. Darf nicht verwendet werden in Gebieten, die unter Naturschutz stehen (sowie die massgebenden Vorschriften oder Vereinbarungen nicht anderes bestimmen): in Riedgebieten, Mooren, Hecken und Feldgehölzen; in oberirdischen Gewässern und in einem Streifen von drei Metern Breite entlang von oberirdischen Gewässern sowie in der Zone 5 l von Grundwasserschutzzonen (Fassungsbereich).

Verpackung vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen!

Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, 6250 Kundl/Österreich

BIOSOL	
Tip gnojiva:	ORGANSKO GNOJIVO biljnog porijekla dopušteno u ekološkoj proizvodnji .
Naziv i sadržaj hranjivih: Suhla tvar 92,0 % Organska tvar 85,8 % Pepeo 6,2% Sadržaj ukupnog dušika(N) 6,88 % Fosfora (P ₂ O ₅) 1,36 % Kalija (K ₂ O) 0,64 % Kalcija (Ca O) 0,24 % Magnezija (MgO) 0,07%, Zeljezo (Fe) 0,01 % Natrij (Na ₂ O) 0,91% Kalcijina teškila metala je ispod maksimalno dopuštenih koncentracija propisanih pravilnikom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta (NN15/92): Sadržaj bakra (Cu) 9,24mg/kg, olova (Pb) 921 mg/kg, kadmija (Cd) 0,01 mg/kg, kroma (Cr) 1,22 mg/kg, nikla (Ni) 0,51 mg/kg, i cinka (Zn) 3,34mg/kg. Olovo, 0,21 mg/kg, aluminij 38,9 mg/kg. Sadržaj vode: 8,00%	
Kulture i doziranje: Vinogradi 500-700kg/ha, Voćnjaci 600-800 kg/ha Povrće (rajčica i paprika) - 800-2.500kg/ha, Krompir 1000-1500kg/ha, tikvice 600-800kg/ha, jagode 900-1200 kg/ha, ilvade i pašnjaci 800kg/ha, ukrasno bilje 200kg/m ² , štiklice 500-600kg/ha, lešćema repa - 800-1300kg/ha	
Način primjene : Razbacati po površini i lagano unijeti u tlo.	
Skladištenje :	Skladištiti u originalno zatvorenoj ambalazi u suhom prostoru zaštićenom od izravne svjetlosti.
Način pakiranja :	Pe vreće od 25 kg
Certificirano :	InfoXgen i Omri
Proizvođač :	Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10,6250 Kundl,Austria
Zastupnik i distributer :	Prijemni d.o.o., Špilka 27,520350 Metković Tel: 020/681946, Fax : 020681327

Производител:
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl www.biosol.com

БИОСОЛ® 25кг

Произведено в Австрия
Висока: "ОРАНИКЕРИ ГИМЕТ II" ЕООД, София 1421, бул. "Арсеналиски" 21, тел/факс: 02/963 0188, 963 17 08, e-mail: office@ginmet.bg, www.ginmet.bg
Reg. № 0142 – 2, 12.09.1016г.

Органичен тор от гранулирана биомаса, приложим за биологично земеделие
Основа на продукта:
85% органично вещество
6 – 8% N общ азот
0,5% P₂O₅ общ фосфор
0,3% K₂O общ калий

Гранулираните **БИОСОЛ®** може да се разпръсква ръчно или механично.

БИОСОЛ® се прилага върху повърхността на парцела. При млади растения торът трябва да бъде разпръснат поне две седмици преди засаждането.
Приложение от 50 до 250кг/дка за сезон, спрямо нуждите на културите.
Освръщаните опаковката на сухо място, защитено от управленствени лица.