

CORON® 28-0-0

**ΑΠΛΟ ΥΓΡΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ
ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ
ΛΙΠΑΣΜΑ -
ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(Β)(Ι)**

**ΥΓΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ (N)
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ**



BIOGARD®
biological First.

Περιεχόμενο: 4 L ~ 5 kg

Σύνθεση: % β/β:

28 % Ολικό Αζωτο (N)

16,5 % μεθυλενο-ουρικό άζωτο

11,5 % ουρικό άζωτο

Συστατικά: Μεθυλενο-ουρία Αριθ. CAS 9011-05-6 (ΚΣΥ 8: Πολυμερή θρεπτικών στοιχείων).

pH: 9,5

Περιεκτικότητα σε διουρία (β/β): < 0,5%

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Το **CORON** είναι ένα υγρό αζωτούχο λίπασμα στο οποίο το άζωτο βρίσκεται σε μορφή πολυμερισμένης ένωσης ουρίας.

Εξαιτίας των ειδικών μορφών αζώτου που περιέχει:

- δεν προκαλεί εγκαύματα σε φύλλα, βλαστούς και καρπούς στις συνιστώμενες δόσεις,
- δεν προκαλεί υπερβλάστηση, ιδιότητα ιδιαίτερα χρήσιμη στις μεγεθύνσεις της σουλιτανίας,
- προσλαμβάνεται εύκολα από τα φυτά και λειτουργεί κάτω από οποιοσδήποτε καιρικές συνθήκες,
- δεν αποπλένεται εύκολα ακόμα και στα ελαφριά εδάφη και παραμένει στη διάθεση του φυτού επί μακρό διάστημα.
- δε φράζει τα ψεκαστικά και τα αρδευτικά συστήματα και δεν προκαλεί διάβρωση στους ψεκαστήρες.
- η χρήση του δεν αυξάνει τη συγκέντρωση νιτρωδών στο έδαφος.

Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μην γίνεται υπέρβαση των δόσεων εφαρμογής.

Η Εταιρεία εγγυάται τη σύνθεση, τη μορφή και το περιεχόμενο. Ο χρήστης ευθύνεται για ζημιές (έλλειψη αποτελεσματικότητας, κατακρήμνιση μίγματος κ.λπ.) που προκαλούνται από μερική ή ολική μη τήρηση των οδηγιών. Επικοινωνήστε με την εταιρεία ή τον διανομέα της εταιρείας που αναγράφεται στην ετικέτα για ειδικότερες συστάσεις και αποφύγετε την υπέρβαση των συνιστώμενων δόσεων.

Ο ρυθμός απελευθέρωσης θρεπτικών συστατικών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη μικροβιακή περιεκτικότητα και τη θερμοκρασία του υποστρώματος. Μπορεί να είναι απαραίτητη πρόσθετη λίπανση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά από το χειρισμό.

Πλύνετε τα χέρια στο τέλος κάθε βάρδιας εργασίας και πριν φάτε ή πείτε.

EL



8 050539 002060

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτό το λίπασμα περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να απελευθερώσει αμμωνία και να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Το **CORON** μπορεί να εφαρμοστεί διαφυλλικά, με πότισμα στο έδαφος ή από το σύστημα στάγδην άρδευσης.

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Σπηρά: 200-400 g/στρέμμα μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα φυτοθρεπτικά σκευάσματα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αποφεύγουμε περιττές επιφανειακές λιπάνσεις αζώτου και κατά συνέπεια την περίσσεια νιτρικών στο έδαφος.

Καλαμπόκι: 200 g/στρέμμα.

Οπωροφόρα: 200-400 g/100 κλά νερού μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα φυτοθρεπτικά σκευάσματα.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην πλήρη άνθηση για καλύτερο δέσιμο και για μείωση των συνεπειών από ελαφρές παγοπληξίες.

Εσπεριδοειδή: 200-300 g/100 κλά νερού σε συνδυασμό με **PHYTAGARD PLUS** για βελτίωση του μεγέθους και του χρώματος.

Ελιά: 200-400 g/100 κλά νερού πριν την άνθηση σε συνδυασμό με **BOROGREEN**. Επανάληψη το φθινόπωρο για καλύτερη ανθοφορία την επόμενη σεζόν. Στις επιτραπέζιες ελιές, σε συνδυασμό με **CYTOKIN 1-0-6**, επιτυγχάνεται μεγένθυση του καρπού όταν ψεκάζεται στη φάση του καρπιδιού.

Κηπευτικά: 200-400 g/100 κλά νερού μετά τη μεταφύτευση μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα λιπάσματα.

Σπορέο: 400-500 g/100 κλά νερού στο στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων.

Βαμβάκι: Για να αποφεύγουμε την περίσσεια των νιτρικών στο έδαφος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε πολλές εφαρμογές το **CORON** είτε από τη σταγόνα είτε από το φύλλωμα αντί άλλων μορφών αζώτου. Σε συνδυασμό με **CYTOKIN 1-0-6** στην πρώτη άνθηση, βελτιώνει την καρπώδωση.

Επίσης η εφαρμογή του τον Αύγουστο αυξάνει το βάρος των καρυδιών.

Χλοστάπτες & Καλλωπιστικά: 400-600 g/100 κλά νερού μετά από κάθε κοπή ή κλάδεμα.

Πατάτα: Μόλις δημιουργηθούν οι πρώτοι μικροί κόνδυλοι σε συνδυασμό με **CYTOKIN 1-0-6** ή **PHYTAGARD PLUS**.

Η ίδια εφαρμογή επαναλαμβάνεται μετά από 7-10 ημέρες.

Αμπέλια (επιτραπέζια & οινοπαιεία): 200-400 g/100 κλά νερού καθ' όλη τη βλαστική περίοδο.

Σουλτανία: 200 g/100 κλά νερού.

Σε αντίθεση με άλλες μορφές αζώτου δεν προκαλεί βλαστομανία και έτσι η κλημιτίδα βγαίνει πιο ψημένη την επόμενη σεζόν.

Σπαράγγια: 200 g/100 κλά νερού, τουλάχιστον 2 εφαρμογές.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν θειάφι. Να μην ψεκάζεται πάνω σε επιφάνειες που είναι ακονισμένες με θειάφι.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το προϊόν παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 1 έτος στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και σε θερμοκρασία 5 έως 25°C. Παρασκευάστε το ψεκαζόμενο μίγμα λίγο πριν την εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Γενικές πληροφορίες: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Σε περίπτωση που ο πάσχων χάσει τις αίσθήσεις του απομακρύνετε τον από την περιοχή κινδύνου και τοποθετήστε τον σε σταθερή (πλάγια) θέση.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε). Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, καθώς επίσης και κάτω από τα βλέφαρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπνέεται.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως με άφθονο νερό. Πιείτε άφθονο νερό και προκαλέστε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica, 25 – 24050 Grassobbio (BG), ITALIA

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.

Κέρκυρα 62 & Κονίτσης 38, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6460700

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ & ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Αναγράφονται πάνω στη συσκευασία

