

Εντομοκτόνο/  
ακαρεοκτόνο  
επαφής.



**ΒΙΟΓΑΡΔ**  
biological first.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1Λ

Ελαφδός συμπτωμάτων εναισθήσεως (OD)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Δραστική ουσία (Beauveria bassiana strain ATCC 74040): **0,0185%** (β/β) ή **0,019%** (β/ω) (min 2,3 x 10<sup>6</sup> CFU/ml)  
Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 100 % β/β

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Το NATURALIS είναι εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο που περιέχει ζωντανά σπόρια του μύκητα *Beauveria bassiana* στέλεχος ATCC 74040. Το στέλεχος αυτό απαντά στη φύση και δεν είναι γενετικά τροποποιημένο για την καταπολέμηση διαφόρων ειδών εντόμων και ακάρεων που προσβάλλουν φρούτα, λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά. Δρα κυρίως διεσπώντας και επίσης εμφανίζει επιρροδυντική δράση στην υφαστική των δέντρων που προσβάλλουν τα φρούτα. Τα κωνίδια του μύκητα *Beauveria bassiana* στέλεχος ATCC 74040 προσκολλούνται στο περιβλημα των εντόμων και ακάρεων, βλάστησαν και διεισδύουν διαγόντων τον μύκητα μέσα στον ζωντικό. Ο θάνατος των εντόμων οφείλεται στη μηχανική εξάλειψη του μυκηλίου, με συνέπεια την απώλεια νερού και θρεπτικών στοιχείων από το έντομο, σε συνδυασμό με την έκκριση ενζύμων υδρόλυσης. Το NATURALIS καταπολέμει τέλεια έντομα και ιδιαίτερα τα πρώιμα στάδια (αυγά και προνύμφες) των αλευράδων, θρίπων, τετρανύχων, διπτέρων, ψύλλων αγχιδιάς, σιδηροσκώληκων και ορισμένων ειδών αψιδών, τα οποία προσβάλλουν φρούτα, λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά σε θερμοκήπια και στο ύπαιθρο.

**ΠΡΟΟΡΙΣΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**  
**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΥΑΑΤ): 14531/27-07-2015**

Κάτοχος της έγκρισης:  
CBC (Europe) S.r.l.  
via Zanica 25  
24050 Grassano (BG), Italy

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
BIOGARD GREECE E.P.E.

Λεωφ. Κηφισίας 18,  
115 26 Αθήνα, τηλ. 210-6460700

Το προϊόν είναι καταλληλό για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:** Πεδίο Εφαρμογής, Στόχος, Δόσεις σκευάσματος\*, Τρόπος και χρόνος εφαρμογής, Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: **ΕΣΠΕΡΙΟΔΕΙΔΗ:** Μύγα Μεσογείου, ΔΟΞΗ: 100-200 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 80-200 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανολήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών.

**ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ:** Ψύλλοι αγχιδιάς, ΔΟΞΗ: 100-200 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Κόκκινες τετρανύχες ΔΟΞΗ: 100-150 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανολήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών.

**ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:** Ροδακινιά, Βερκοκιά, Διαμασκηλιά: Θρίπες, ΔΟΞΗ: 100-150 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 80-120 λίτρα/στρ. **Κερασιά:** Μύγα κερασιάς, ΔΟΞΗ: 100-200 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανολήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών.

**ΦΡΑΓΟΥΛΑ (Υ+Θ):** Αλευράδες, Κονός τετρανύχος ΔΟΞΗ: 75-100 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. Θρίπες, ΔΟΞΗ: 100-150 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανολήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών**

**ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών. **ΑΜΠΕΛΙ:** Τετρανύχες, ΔΟΞΗ: 100-150 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Τζιζμώκη ΔΟΞΗ: 100-150 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 30-150 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανολήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών. **ΔΙΟΤΣ:** Μύγα Μεσογείου, ΔΟΞΗ: 100-200 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 80-200 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανολήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών. **ΕΛΙΑ:** Δόκος, ΔΟΞΗ: 100-200 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 80-200 λίτρα/στρ. Εφαρμογή ανάλογα με τη συλλήψεις των ενιλικών ατόμων του δόκου στις παγίδες και επανολήψεις μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών. **ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Υ+Θ):** Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα: Αλευράδες, ΔΟΞΗ: 75-100 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. Θρίπες, ΔΟΞΗ: 100-150 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. Κονός τετρανύχος, ΔΟΞΗ: 100-200 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανολήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών. **ΣΙΔΗΡΟΣΚΩΛΗΚΕΣ:** ΔΟΞΗ: 100-200 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 20-100 λίτρα/στρ. Μια εφαρμογή μετά τη φύτευση και επανολήψη σε 7-14 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών. **ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ):** Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα: Ακαρι τριτάτος (σκαριώδης τετρανύχος), ΔΟΞΗ: 100-200 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανολήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών. **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με ή χωρίς βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ):** Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθες, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ): Κολοκυθάκια, Αγγούρι: Αλευράδες, ΔΟΞΗ: 75-100 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. Θρίπες, ΔΟΞΗ: 100-150 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. Κονός τετρανύχος, ΔΟΞΗ: 100-200 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανολήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών. **ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ (Υ+Θ):** Μπρόκολο, Κουνουπίδι: Αλευράδες, ΔΟΞΗ: 100-200 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανολήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών. **ΦΥΛΛΩΔΗ ΑΧΑΝΑΚΙΑ (Υ+Θ):** Μαρούλι, Αντιό, Ραδικί, Αψίδες, ΔΟΞΗ: 75-100 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανολήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών. **ΨΥΧΑΝΘΗ (Υ+Θ):** Φασόλι με λοβό και χωρίς λοβό: Αλευράδες, ΔΟΞΗ: 100-150 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανολήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών. **ΠΑΤΑΤΑ:** Σιδηροσκώληκες, Εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος. Μια εφαρμογή κατά τη φύτευση και επανολήψη κατά το πατάκισμα. ΔΟΞΗ: 200-300 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 8-50 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών. Εφαρμογή με στάγδην άρδευση. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανολήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. ΔΟΞΗ: 50-100 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 1000-4000 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών.

**ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ & ΚΑΛΩΔΙΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ+Θ):** Αλευράδες, ΔΟΞΗ: 75-100 κ.ε./στρ. Ογκος ψεκ. Υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανολήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών.

\* Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

- Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά.
- Η εφαρμογή του σκευάσματος να διενεργείται κατά τις πρώτες πρωινές ή απογευματινές ώρες, όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή και τα έντομα είναι λιγότερο δραστήρια. Σε περίπτωση παρατεταμένης βροχόπτωσης αμέσως μετά την εφαρμογή, συνιστάται επανόληψη του ψεκασμού.
- Γενικά να εφαρμόζεται όταν οι πληθυσμοί των εντόμων είναι σε χαμηλά επίπεδα. Σε περίπτωση μεγάλου πληθυσμού εντόμων δύναται να συνδυαστεί με κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα σκευάσματα, περιλαμβανομένων των βερνικών παραφινικών λαδιών.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΗ:** Μη εφαρμόσιμα για όλες τις καλλιέργειες.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

Ψεκασμοί φυλλώματος με επαρκή ποσότητα νερού για πλήρη κάλυψη, με χρήση ισχυρότερης συνθήκης ψεκαστικού εξοπλισμού. Για την καλλιέργεια της πατάτας το προϊόν μπορεί επιπλέον να εφαρμοστεί και με χρήση όλων των τύπων της στάγδην άρδευσης.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Ανακινούμε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και αφού βάλουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος το συμπληρώνουμε με νερό αναδευόμενος συνεχώς. Η ανάδευση να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται αμέσως μόλις ετοιμαστεί το ψεκαστικό υγρό. Το ψεκαστικό δοχείο δεν πρέπει να περιέχει υπολείμματα ψεκαστικού υγρού από προηγούμενες εφαρμογές με φωτοπροστατευτικό προϊόντα.

**ΚΑΒΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Αμέσως μετά την εφαρμογή οδεύστε τελείως τον ψεκαστικό. Συνέχιστε σχολαστικά το βούτι και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορριπτικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Επαναλάβετε τη διαδικασία με καθαρό νερό δύο (2) φορές. Να φοράτε προστατευτική ενδυμασία και γάντια όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήματα.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει πρέπει να αραιώνεται με νερό και να ψεκάζεται στην περιοχή που έχει ήδη γίνει εφαρμογή. Οι ψυλές ξεπλύνονται από πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στην συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπια, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:**

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα εντομοκτόνα για τη βελτίωση της καταπολέμησης του πληθυσμού των εντόμων. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται ο χρόνος αναμονής του συνδυαστικού προϊόντος. Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό κάτω από συνθήκες ορθού χειρισμού. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μαζί με προϊόν που δεν έχει δοκιμαστεί πρέπει πάντοτε να προηγηθεί δοκιμή ελέγχου της συνδυαστικότητας και οποιασδήποτε φυτοτοξικότητας που μπορεί να προκληθεί από το μίγμα με το προϊόν που δεν έχει δοκιμαστεί, καθ' όσον οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέρα από τον έλεγχο μας.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** Διαχέριση ανεπιθύμητων. Το σκεύασμα περιέχει φυσικά στελέχη του μύκητα *Beauveria bassiana* στέλεχος ATCC 74040 που ανήκει στην ομάδα UNF κατά IRAC. Συνιστάται η ανάληψη με σκευάσματα άλλης ομάδας με διαφορετικό τρόπο δράσης.

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:**

Περίεχει φυσικά στελέχη του μύκητα *Beauveria bassiana* στέλεχος ATCC 74040. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν ανοσοανεπάρκεια ή διατελούν υπό θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες.

**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:**

- Φοιδάστεται κλειδωμένο. Κανένα από πιπιδά.
- Μην τρώτε, πινείτε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια, γυαλιά και μέσα απομην προστασίας της αναπνοής κατά την ανάληψη φόρτωσης και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεξέτασης στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.
- Αδιάθετο του περιεχομένου/περιέκτητα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Μην πολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιδοστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

Σε περίπτωση επαφής με το μάτι, κρατείστε το ανοικτό και πλύνετε τα απαλά με νερό για 15-20 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, μετά από 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλύνετε. Ζητείστε ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός επιμένει. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν βροχεί με το προϊόν και ξεπλύνετε το δέρμα που έχει έλθει σε επαφή με το προϊόν με άφθονο νερό για 15 έως 20 λεπτά. Ζητείστε ιατρική βοήθεια εάν είναι απαραίτητο. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα διαφυγεροποιήσετε. Σε περίπτωση κατάποσης, μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή αν το άτομο δεν αναπνέει. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε ιατρική βοήθεια. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς συμβουλή ιατρού. Μη χορηγείτε κανένα υγρό στον πάσχοντα από το στόμα ιδιαίτερα όταν δεν έχει τις αισθήσεις του. Αν υπάρχει υποψία δηλητηρίασης, καλέστε αμέσως ένα γιατρό, το πλησιέστερο νοσοκομείο ή το πλησιέστερο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Ενημερώστε το άτομο με το οποίο θα έλθετε σε επαφή για το πλήρες όνομα του προϊόντος, και το είδος και την ποσότητα της έκθεσης.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΑΙ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΩΝ:** 210 77 93 777.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες καλλιέργειες και δόσεις εφ' όσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στην ετικέτα.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Το προϊόν διατηρείται σε ξηρό, δροσερό (σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 25° C) και αεριζόμενο χώρο, μακριά από έστιες θερμότητας και το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες, παραμένει σταθερό για (1) έως από την ημερομηνία παρασκευής του.

**ΑΡΠΑΤΙΔΙΑΣ:**

ΗΜΙΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: — Αναγράφονται πάνω στη συσκευασία  
ΗΜΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: —

EL



Rev. 10-2022