

NEMGUARD® GRANULES



**Νηματωδοκτόνο κοκκώδες (GR)
για χρήση από το έδαφος
με βάση το εκχύλισμα σκόρδου
BIOGARD®
biological First.**

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Εκχύλισμα σκόρδου 45,0 % (B/B)
Βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% B/B

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Μακριά από παιδιά.
• Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν.
• Χρησιμοποιήστε προστατευτικά ενδύματα και κατάλληλα γάντια και προστατέψτε τα μάτια και το πρόσωπο. • Το δελτίο δεδομένων είναι διαθέσιμο εφόσον ζητηθεί. • Για να αποφευθούν κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην πλύνετε τα υάτια με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα καλά με νερό.
• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό. • Εισπνοή: Μεταφέρετε το άτομο σε καθαρό αέρα. • Κατάποση: Πιείτε άφθονες ποσότητες νερού. Κατά τη διάρκεια του συνήθους χειρισμού και ιδιαίτερα εάν το προϊόν βρέχεται ή είναι υγρό, αναπτύσσεται μια έντονη οσμή σκόρδου που μπορεί να προκαλέσει δακρύρροια. Εάν αυτό συμβεί, μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα και εάν χρειαστεί πλύνετε τα μάτια με νερό. Εάν τα συμπτώματα παραμένουν, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Αν υπάρχει υποψία δηλητηρίασης, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό, το πλησιέστερο νοσοκομείο, ή το πλησιέστερο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Αναφέρετε στο άτομο που θα έλθετε σε επαφή το πλήρες όνομα του προϊόντος, και τον τύπο και την ποσότητα της έκθεσης. Περιγράψτε οποιαδήποτε συμπτώματα και ακολουθήστε οποιαδήποτε συμβουλή που θα σας δοθεί. Αντίδοτο δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Νηματωδοκτόνο. Οι κόκκοι του NEMguard διαθέτουν διάφορους τρόπους δράσης κατά των νηματωδών. Η δραστική ουσία στους κόκκους του NEMguard θεωρείται ότι δρα στο ένζυμο αναπνοής προκαλώντας κυταροτοξικές διαταραχές. Λόγω της φυτικής προέλευσής τους, τα συστατικά του εκχυλίσματος σκόρδου δρουν με διάφορους τρόπους επί των φυτικών παρασίτων. Το διαλλυλο-δισουλφίδιο και το διαλλυλο-τρισουλφίδιο έχει καταδειχθεί ότι αναστέλλουν την παραγωγή ακετυλοχολινεστεράσης. Η διατορακή της λειτουργίας των ενζύμων οφείλεται πιθανόν στις εξαιρετικά δραστικές πολυσουλφιδικές ομάδες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ενζυματική παρεμπόδιση μέσω διαδικασίας εισαγωγής σταυροδεσμών με βιοαλικές ομάδες στα ένζυμα, μεταβάλλοντας έτσι – κατά κρίσιμο τρόπο – τη δομή στο χώρο. Μερικοί ερευνητές έχουν παρατηρήσει ωκάντες δράσεις στο σκαρβέλαιο, και εκτός από αυτές τις δράσεις, το σκαρβέλαιο εμφανίζει απωθητικότητα σε πολλά και διάφορα είδη εντόμων. Το γεγονός αυτό θεωρείται ότι προκαλεί μείωση της βιωσιμότητας των αυγών και θάνατο των νηματωδών όλων των σταδίων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής, Στόχος, Δόσεις σκευάσματος. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ελεύθεροι νηματωδείς, και Κοινοβιομητωδείς (*Tylenchidae*). Κατά τη στιγμή σποράς ή μεταφύτευσης. **ΚΑΡΟΤΑ** (Υπαίθρια), **ΣΟΛΑΝΩΔΗ** (Υπαίθρια & Θερμοκηπίου), **Τομάτα**, **Πιπεριά**, **Μελιτζάνα**, **ΜΑΡΟΥΛΙΑ & ΣΥΝΑΦΗ** (Υπαίθρια και θερμοκηπίου): 2-2.5 κιλά/στρέμμα. **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: ΠΕΠΟΝΙΑ-ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ** (Υπαίθρια & θερμοκηπιακά): 2.5 κιλά/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1 εφαρμογή.

Παρατηρήσεις: Εάν το έδαφος τη στιγμή της σποράς είναι στεγνό, θα πρέπει να αρδεύεται με τουλάχιστον 20 mm όσο το δυνατόν νωρίτερα μετά την εφαρμογή. Εάν παραμένουν οι συνθήκες ανομβρίας, αρδεύστε περαιτέρω μέχρι να φθάσετε στο σύνολο των 80 mm. Οι καλύτερες συνθήκες για τη χρήση του προϊόντος επιτυγχάνονται όταν το έδαφος είναι αρκετά υγρό. Για να έχετε μια άριστη κατανομή για θα πρέπει

οι κόκκοι να διαλυθούν στο έδαφος έτσι ώστε να απελευθερώσουν την δραστική ουσία στην περιοχή γύρω από τις ρίζες. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Μην εφαρμόζουμε **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Το προϊόν εφαρμόζεται με μηχανοκίνητο κοκκοδιασπαστή στις γραμμές μεταφύτευσης, ή στην αυλακία που αντιστοιχεί στη θέση σποράς ή μεταφύτευσης. Το προϊόν είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογή ανά φυτό με τα κατάλληλα μηχανήματα. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Ξέπλυμα, πλύση και διάθεση των περιεκτών με ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Οι χρήστες πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΤΡΙΚΗΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση παρατεταμένων συνθηκών ανομβρίας. **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Αναφορές σε δυσμενείς επιδράσεις δεν έχουν ρητά καταγραφεί, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε οποιαδήποτε από τις δοκιμές για οποιοδήποτε δυσμενείς επιδράσεις. Οι κόκκοι του NEMguard δεν αναμένεται να επιφέρουν δυσμενείς επιδράσεις λόγω των αδρανών συστατικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του σκευάσματος και λόγω του τρόπου δράσης ο οποίος δεν επηρεάζει τα φυτά. Οι κόκκοι του NEMguard δεν αφήνουν υπολείμματα. Το προϊόν αποδομείται προσεκτικά μετά την εφαρμογή σε ουσίες που απορρέουν σε βαθύτερα εδαφικά στρώματα. **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο του. **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό χώρο. Να προστατεύεται από παγετό. Στις κανονικές συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 5 KG

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: } Αναγράφονται πάνω
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: } στη συσκευασία

Κάτοχος της έγκρισης:
CBC (Europe) S.r.l. via Zanica 25
24050 Grassobbio (BG), ΙΤΑΛΙΑ

ΑΑΔΑ Υπ. Αγροτ. & Τροφίμων: 3056/14/05/2015

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

BIOGARD®
biological First.

BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Κηφισίας 18, 115 26 Αθήνα, Τηλ. 210-6460700

