

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Αναφορές σε δυσμενείς επιπτώσεις δεν έχουν ρητά καταγραφεί, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε οποιαδήποτε από τις δοκιμές για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις. Το NEMguard SC δεν αναμένεται να έχει οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις λόγω του τρόπου δράσης ο οποίος δεν επηρεάζει τα φυτά. Το NEMguard SC δεν αφήνει υπολείμματα. Το προϊόν δεν εμμένει και μετά την εφαρμογή του αποικοδομείται ταχέως σε κατώτερα εδαφικά στρώματα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Δελτία δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • **Μη** μολύνετε τα ύδατα με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Αφαιρέστε τους φακούς επαφής και ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για 15 λεπτά τουλάχιστον. Ζητείστε ιατρική βοήθεια αν υπάρχει ερεθισμός και επμένει.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε άμεσα με σαπούνι και άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Διατηρείστε τον ασθενή ζεστό και σε ανάταση.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό εκτός αν υπάρχει τέτοια οδηγία από γιατρό ή από το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε καλά το στόμα και χορηγείτε νερό σε μικρές ποσότητες. Διατηρείστε τον ασθενή ζεστό και σε ανάταση.

• **Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.**
Διατηρείστε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό. Κατά τη διάρκεια του κανονικού χειρισμού και ειδικότερα αν το προϊόν καταστεί υγρό ή υγρό μπορεί να γίνει εμφανής οσμή σκόρδου που μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα δοκρύρροιας. Αν συμβεί αυτό, μετακινείτε τον ασθενή σε καθαρό αέρα και αν είναι αναγκαίο πλύνετε τα μάτια του με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ζητείστε ιατρική βοήθεια. Αντίδοτο δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777


ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Φυλάξτε το προϊόν στον αρχικό του περιέκτη, σε δροσερό και ξηρό χώρο. Προστατέψτε το από το ψύχος. Σε θερμοκρασία δωματίου το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστο από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Αναγράφονται πάνω στη συσκευασία




Κάτοχος της έγκρισης:
CBC (Europe) S.r.l. Via Zanica, 12
24050 Grassobbio (BG), Italy
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά
BIOGARD GREECE E.Π.Ε.
Λεωφ. Κηφισίας 18, 115 26 Αθήνα,
Τηλ. 210-6460700



NEMGUARD® SC

Νηματοδοκτόνο
Για τον έλεγχο
νηματοδών του γένους
Meloidogyne.



Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 λίτρο

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Εκχύλισμα σκόρδου (Garlic extract) 100,0 % β/β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Νηματοδοκτόνο. Παρεμπόδιση των αναπτυσσόμενων ενζύμων των νηματοδών και πρόκληση οξειδωτικού στρες δια της αλληλεπίδρασης των πολυσακχαριδίων με τις χαμηλού μοριακού βάρους κυταρικές θειώδες.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (YAAT): 3067/ 13-12-2018

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:

ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Y+Θ): ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με βρώσιμο φλοιό (Y+Θ): ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με μη βρώσιμο φλοιό (Y+Θ): ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ: Νηματοδείς του γένους *Meloidogyne*. Δόση: 400 κ.εκ/στρέμμα (max), 13,3-400 κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού, Όγκος ψεκ. υγρού 100 – 3000 λίτρα / στρέμμα. Εφαρμογή μέσω όλων των συστημάτων άρδευσης στάγδην ή με πισπιτήρι πριν, κατά ή μετά τη μεταφύτευση / σπορά. BBCH 00-BBCH 89.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές.

Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-14 ημέρες.

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ*(Χρήση Ήσσονος Σημασίας): Νηματοδείς του γένους *Meloidogyne*.

Δόση: 400 κ.εκ/στρέμμα (max), 13,3-400 κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού, Όγκος ψεκ. υγρού 100 – 3000 λίτρα / στρέμμα. Εφαρμογή μέσω συστημάτων στάγδην άρδευσης, με πισπιτήρι ή άλλοις τρόποις συστημάτων άρδευσης (BBCH 00-89).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές.

Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10 ημέρες.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Για όλες τις συγκεκριμένες χρήσεις: 0 ημέρες

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το προϊόν εφαρμόζεται μέσω όλων των συστημάτων άρδευσης στάγδην ή με πισπιτήρι πριν, κατά ή μετά τη μεταφύτευση/σπορά. Οι καλύτερες συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος είναι όταν το έδαφος είναι αρκετά υγρό. Συνιστάται επαρκής ποσότητα νερού στο νερό της άρδευσης προς το τέλος του κύκλου άρδευσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Εφαρμόστε όγκους νερού μεταξύ 100 και 3000 L/στρέμμα για κάθε κύκλο άρδευσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Επαναλάβετε δύο φορές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Ξεπλύνετε, πλύνετε και διάθεστε των περιεκτών με ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: δεν απαιτείται. Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο του.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Οι χρήστες πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου