

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΥΡΕΘΡΙΝΕΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



Αριθμός Άδειας
Διάθεσης στην Αγορά
(ΥΑΑΤ): 14.595/2-2-2017

BIOGARD
biological First.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1L

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εντομοκτόνο επαφής της ομάδας των φυσικών πυρεθρινών για την αντιμετώπιση μυζητικών εντόμων. Χαρακτηρίζεται από ταχεία και σύντομη διάρκεια δράσης και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στην εποχή απελευθέρωσης ωφέλιμων εντόμων.

Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων προκαλώντας αρχικά παράλυση και στη συνέχεια το θάνατό τους.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΛΙΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ: Αφίδες, 75-90 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού - Ψεκασμοί πριν την

άνθηση, με την έναρξη της προσβολής. ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Αφίδες, 75-90 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.

υγρού - Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής. ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια και οиноποιήσιμα σταφύλια):

Τζιτζικακία, 75-90 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού - Ψεκασμοί μετά την άνθηση στο στάδιο μικρών καρπών.

ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ (Υπαίθρου και θερμοκηπίου): Αλευρώδεις, 75-90 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.

υγρού - Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής και πριν την απελευθέρωση ωφέλιμων εντόμων.

ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ (Υπαίθρου και θερμοκηπίου): Αλευρώδεις, 75-90 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού -

Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής και πριν την απελευθέρωση ωφέλιμων εντόμων. ΠΕΠΟΝΙ,

ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υπαίθρου και θερμοκηπίου): Αλευρώδεις, 75-90 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού -

Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής και πριν την απελευθέρωση ωφέλιμων εντόμων. ΜΑΡΟΥΛΙ &

ΆΛΛΑ ΣΑΛΑΤΙΚΑ (ακρόαλα ή πικράδα, Αντίδι, Ρόκα, Φύλλα και λθατοί του είδους brassica), ΣΠΑΝΑΚΙ,

ΣΕΣΚΟΥΛΑ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ (υπαίθρου & θερμοκηπίου): Αφίδες, 75-90 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού -

Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής.

ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (λίτρα/σπρέι/μπα): Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά,

Ροδακινιά, Νεκταρινιά): 80-100, Αμπέλι (Επιτραπέζια και οиноποιήσιμα σταφύλια): 80-100, Τομάτα,

Μελιτζάνα, Πιπεριά (Υπαίθρου και θερμοκηπίου): 80-100, Αγγούρι, Κολοκύθι (Υ+Θ): 80-100, Πεπόνι,

Κολοκύθα, Καρπούζι (Υ+Θ): 80-100, Μαρούλι & άλλα σαλατικά, Σπανάκι, Σέσκουλα & παρεμφερή

(Υ+Θ): 65-80.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο: 2 εφαρμογές για όλες τις καλλιέργειες.

Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 7 για όλες τις καλλιέργειες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Η δόση/ 100 λίτρα νερού θα πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού

υγρού ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη επιτρεπτή δόση/στρ. 2. Οι εφαρμογές να γίνονται στις όροσερές

ώρες της ημέρας, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. 3. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 4. Εξασφαλίστε καλή

κάλυψη των φυτών, ιδίως της κάτω επιφάνειας των φύλλων σε περίπτωση προσβολής από αλευρώδεις. 5.

Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες): • Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά: Δ.Ε.

καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης κατά την εφαρμογή. • Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Αμπέλι: 3 • Τομάτα,

Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Κολοκύθα, Καρπούζι, (Υ+Θ): 1 • Μαρούλι & άλλα

σαλατικά, Σπανάκι & παρεμφερή (Υ+Θ): 2

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό

μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστάμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο

αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αφήνετε

το ψεκαστικό διάλυμα για πάνω από 24 ώρες. Το pH του νερού δεν πρέπει να είναι αλκαλικό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε δυο

φορές το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού μηχανήματος με καθαρό νερό και απορρυπαντικό.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Να μη συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις δόσεις και καλλιέργειες που συνιστάται και κάτω

από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2011/65 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν

Κάτοχος της άδειας: CERRUS s.a.s.
via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA), ΙΤΑΛΙΑ
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε. Κηφισίας 18, 115 26 Αθήνα - Τηλ. 210-6460700

PYREGARD: Εντομοκτόνο

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Pyrethrins.....4% 8/0 Βοηθητικές ουσίες....91,11% 8/8

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους

οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Περιέχει Pyrethrins.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Για να αποφύγετε τους

κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις

οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

• Να φοράτε προστατευτικά γάντια • Φοράτε κατάλληλα γάντια, γυαλιά και αλδωμην

φόρμα κατά την ανάμιξη /φόρτωση. • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα

με την εθνική νομοθεσία. • Μην ρυπνίζετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία • Για να

προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά

ύδατα, με φυτική κάλυψη.

- 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά

50% σε καλλιέργειες φυλλωδών και καρποφόρων λαχανικών. - 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση

ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε αμπέλι, - 20 μέτρων σε συνδυασμό

με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε ροδακινιά - νεκταρινιά

μετά την ανθοφορία. - 30 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του

ψεκαστικού νέφους κατά 90% στα πυρηνόκαρπα πριν την άνθηση.

• Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, αφήστε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη

γεωργική γη, στα πυρηνόκαρπα. • Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα

έντομα επικονιάσας μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Μην χρησιμοποιείτε το

πρόϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο

ανθοφορίας των ζιζανίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος

ή την ετικέτα. • Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηρίασεων.

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήσει

ερεθισμό του δέρματος συμβουλευθείτε γιατρό. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά τα μάτια με

άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. • Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον πάθονα στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι κενές συσκευασίες ξεπλύνονται υπό πίεση

με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξέπλυνσης να ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο)

και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρίψιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης,

να ενοπλιστούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΗΚΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΤΕΛΕΙΕΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να γίνεται εναλλαγή εντομοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή

ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Ταξινομηστέ κατά IRAC: Group A/3.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

ΣΥΝΗΚΕΣ ΑΠΟΒΛΕΨΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, στην αρχική του

κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2)

χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Αναγράφονται
πάνω στη συσκευασία

ΠΡΟΣΟΧΗ

