

PHYTAGRO® Plus
ΚΛΠ 1(Γ)(Β): ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα σε διάλυμα.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Σίδηρος (Fe) ως θειικό¹, υδατοδιαλυτό 2 %

Μαγνήσιο (Mn) ως χηλικό σύμπλοκο με EDTA,

υδατοδιαλυτό 0,1 %

Χηλικός Παράγοντας: EDTA. Εύρος pH που εξασφαλίζει καλή σταθερότητα: 4-9

Συστατικά: Σίδηρος (II) επταένυδρος θειικό¹ (CAS 7782-63-0), σιθανόλη² (CAS 64-17-5), μονοξυδικό κηρίο αλφ³ (CAS 5949-29-1), σύμπλοκο EDTA-μαγνησίου δικαλιού⁴ (CAS 15708-48-2); ΚΣΥ 1: ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Μακριά από παιδιά. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα στατικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό. Διάθεση περιεχόμενου/περίεκτου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Για να αποφευχθεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις συστάσιμες οδηγίες χρήσης του σκευάσματος.

Να μην πλύνετε χιτών. Το δοχείο δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Μην απορρίπτετε τα άδεια δοχεία στο περιβάλλον. Η απόρριψη να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Να φυλάσσεται το προϊόν σε χώρο δροσερό, ξηρό με θερμοκρασία 5°C έως 25°C. Μην εκθέτετε το προϊόν σε ακραίες θερμοκρασίες. Διατηρείτε τη συσκευασία ερμητικά κλεισμένη μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

CBC (Europe) S.r.l.
Via Zanica 25
24050 Grassano (BG), Ιταλία

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.
Λεωφόρος Κηφισίας 18, 115 26
ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-6460700

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το PHYTAGRO® Plus είναι ένα προϊόν θρέψης για εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος. Αποτελεί μείγμα ιχνοστοιχείων (Fe και Mn) με ειδική σύνθεση που προωθούν τις φυσιολογικές λειτουργίες των καλλιεργούμενων φυτών και αυξάνουν το δυναμικό παραγωγής τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Το PHYTAGRO® Plus εφαρμόζεται με όλα τα μηχανήματα ψεκασμού, εξασφαλίζοντας την πλήρη και ομοιόμορφη κάλυψη της καλλέργειας και της βλάστησης. Μπορεί να αποτελέσει συστατικό στοιχείο ενός πλήρους προγράμματος θρέψης και να προσφέρει τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την προώθηση των φυσιολογικών λειτουργιών των καλλιεργούμενων φυτών.

Συνιστάται να εφαρμόζεται με νερό οξύτητας pH 6-7 και σε περίπτωση υψηλότερου pH να χρησιμοποιείται κατάλληλο σκεύασμα διάθραξης στα ενδεδειγμένα όρια.

Μπορεί να συνδυαστεί με τα περισσότερα φυτοθρεπτικά προϊόντα. Συνιστάται να διενεργείται πάντοτε δοκιμή συνδυαστικότητας σε μικρό αριθμό φυτών πριν εφαρμοστεί σε μεγάλη έκταση.

Η εταιρεία εγγυάται τη σύσταση, τη σύνθεση και τη μορφή του προϊόντος. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν αστοχίες του προϊόντος (έλλειψη αποτελεσματικότητας, αδυναμία διάλυσης και ανάμιξης κλπ.) που μπορεί να προκληθούν από μερική ή ολική αβλεψία των οδηγιών χρήσης.

Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μην γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Επικοινωνήστε με την εταιρεία/τον διανομέα που αναγράφεται στην ετικέτα για ειδικότερες συστάσεις και αποφύγετε την υπέρβαση των συνιστώμενων δόσεων.

ΑΡΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΗΜΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Αναγράφονται πάνω στη συσκευασία

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ Σύμφωνα
με τον κανονισμό
(ΕΕ) 2018/848



ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

PHYTAGRO® PLUS



BIOGARD®
biological First.

Καθαρό βάρος: 1 Kg

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ

- **Εσπεριδοειδή:** 100 κ.εκ./στρ., από το δέσιμο των καρπών, 2-3 εφαρμογές
- **Ακτινίδια:** 100 κ.εκ./στρ., πριν την ανθοφορία και μετά το δέσιμο των καρπών, 2-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.
- **Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Βερίκοκα, Κεράσια):** 100 κ.εκ./στρ., από το δέσιμο των καρπών, 2-3 εφαρμογές κάθε 14-21 ημέρες για προώθηση της ανάπτυξης των καρπών.
- **Φρούδες:** 75-100 κ.εκ./στρ., 10-14 ημέρες μετά την μεταφύτευση/έναρξη βλαστικής ανάπτυξης, και 2-3 εφαρμογές από την άνθηση ως την ανάπτυξη των καρπών.
- **Ξηροί καρποί:** 75-100 κ.εκ./στρ. μετά το δέσιμο των καρπών με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.
- **Μηλοειδή (Μήλα, Αχλάδια):** 100 κ.εκ./στρ., από το δέσιμο των καρπών, 2-3 εφαρμογές κάθε 14-21 ημέρες για προώθηση της ανάπτυξης των καρπών.
- **Ελιές:** 100 κ.εκ./στρ., 1-2 εβδομάδες πριν την ανθοφορία και μετά το δέσιμο των καρπών.
- **Οινοποιήσιμα σταφύλια:** 75-100 κ.εκ./στρ. όταν γίνουν ορατές οι ταξιανθίες για προώθηση επιμήκυνσης της ράχης.
- **Επιτραπέζια σταφύλια:** 100 κ.εκ./στρ., 2-3 εφαρμογές, αρχίζοντας από όταν γίνουν ορατές οι ταξιανθίες για προώθηση επιμήκυνσης ράχης και στην έναρξη της άνθησης για μείωση της μικροραγιάς. Από το δέσιμο των ραγών 2-3 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες για αύξηση του μεγέθους της ρώγας.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

- **Φυλλώδη λαχανικά (έτοιμα για κατανάλωση κομμένα φύλλα, baby leaf):** 50-75 κ.εκ./στρ. στην εμφάνιση του πρώτου αληθινού φύλλου και μετά από κάθε συγκομιδή.
- **Βολβώδη λαχανικά (σκόρδο, κρεμμύδι):** 50-75 κ.εκ./στρ. στην έναρξη της ανάπτυξης των φυλλών και κατά την διάρκεια ανάπτυξης των εδωδίων των τμημάτων του φυτού (βολβών)
- **Σταράγγια:** 50-75 κ.εκ./στρ. κατά την βλαστική

ανάπτυξη των εναέριων φυτικών τμημάτων και στο τέλος της περιόδου συγκομιδής.

- **Βασιλικός, Φασκόμηλο και άλλα αρωματικά:** 50 κ.εκ./στρ. στην έναρξη της βλαστικής ανάπτυξης.
- **Καρότα και άλλα ριζώδη λαχανικά:** 50-75 κ.εκ./στρ. με την εμφάνιση των πρώτων κεφαλών και στη συνέχεια κάθε 2-4 εβδομάδες για προώθηση της ανάπτυξης των φυτών.
- **Λάχανα, κουνουπίδια, μπρόκολο και άλλα κραιμβοειδή:** 50-75 κ.εκ./στρ. 2 εβδομάδες μετά την μεταφύτευση και επανάληψη σε 2-3 εβδομάδες ανάλογα με τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου
- **Κολοκυνθοειδή (πεπόνι, καρπούζι, αγγούρι, κολοκύθη κ.α):** 75-100 κ.εκ./στρ. μετά την μεταφύτευση, μετά το δέσιμο των καρπών και κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης κάθε 7-10 ημέρες.
- **Φασόλια, φασολάκια:** 50-100 κ.εκ./στρ. με την εμφάνιση των πρώτων ανθών και στο δέσιμο των καρπών.
- **Μελιτζάνες, πιπεριές, τομάτες:** 75 κ.εκ./στρ., 10-14 ημέρες μετά την μεταφύτευση. 100 κ.εκ./στρ. μετά το δέσιμο των καρπών σε κάθε ταξικαρπία.
- **Πατάτες:** 75-100 κ.εκ./στρ. στην έναρξη της ανάπτυξης των κονδυλίων και μετά από 10 ημέρες.
- **Βιομηχανική τομάτα:** 75-100 κ.εκ./στρ. μετά το δέσιμο των καρπών σε κάθε ταξικαρπία.
- **Σπανάκι, μαρούλι, αντίδι, ραδίκι, ρόκα και άλλα φυλλώδη λαχανικά:** 50-100 κ.εκ./στρ. στην εμφάνιση του 4ου-6ου πραγματικού φύλλου.
- **Ξέλινο, σελινόριζα, μάραθο, κ.α:** 50-100 κ.εκ./στρ. στην έναρξη ανάπτυξης των φυλλών και επανάληψη μετά από 14 ημέρες.

ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

- **Ανθοκομικές καλλιέργειες (Χρυσάνθεμα, γαρύφαλλα, ζέρμπερες κ.α):** 100-150 κ.εκ./100 λιτ νερού, 2-3 εβδομάδες μετά την μεταφύτευση και επανάληψη μετά από 2 εβδομάδες.
- **Γλαστρικά φυτά:** 100-150 κ.εκ./100 λιτ νερού, 2 εβδομάδες μετά την μεταφύτευση και επανάληψη κάθε 2-3 εβδομάδες.