

SIBERIO

ΜΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΦΥΤΩΝ

Το **SIBERIO** είναι ένας μη μικροβιακός βιοδιεγέρτης που δημιουργήθηκε για να προάγει τη διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών. Το **SIBERIO**, χάρη στην ιδιαίτερη σύνθεσή του, είναι σε θέση να διεκδικήσει στο εσωτερικό των αδρανών μπουμπούσκων τρέφοντάς τους και προάγοντας τις ενζυμικές και μεταβολικές διεργασίες του φυτού.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλκοόλη C10 αιθοξυλιωμένη¹ (αριθ. CAS 26183-52-8), Νιτρικό αμμωνίου² (αριθ. CAS 6484-52-2), Νιτρικό ασβεστίο³ (αριθ. CAS 15245-12-2), Ουρία⁴ (αριθ. CAS 57-13-6). ¹ΚΣΥ 1: ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: αυτό το προϊόν περιέχει 15% βιβλ. ολικό άζωτο.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μην αναμειγνύετε το **SIBERIO** με άλλα προϊόντα εκτός του νιτρικού ασβεστίου.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΘΕΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το προϊόν αποθηκεύεται σε έρρο και θερμοκρασία (0°C / +40°C) αποθηκευτικού χώρου. Μη εύφλεκτο προϊόν. Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε άφθονο νερό και μην το αφήσετε να διαρρεύσει. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:** Να μην χρησιμοποιείται σε νερά φυτά ηλικίας κάτω των 3 ετών. / Εφαρμόστε σε περιοχές με λιγότερο από 500 κρύες ώρες (Τ < 7,2 °C) / Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε αδύναμα φυτά ή με κακή λίγνωση. / Οποιοδήποτε εφαρμοσμένο ορκετάκιον πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την εφαρμογή του **SIBERIO**. / Να μην εφαρμόζεται κατά το στάδιο βλαστηκής ανάπτυξης των καλλιεργειών. / Αποφύγετε οποιοδήποτε επαφή νερώντων με κοντινές καλλιέργειες, κυρίως σε αειθαλή φυτά (π.χ. εσπεριδοειδή, ελιά). / Μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες άλλες από αυτές που αναγράφονται στην ετικέτα. / Μην αναμειγνύετε με ορκετάκια και άλλα προϊόντα εκτός του νιτρικού ασβεστίου. / Εάν υπάρχουν διαφορετικές ποικιλίες στο ίδιο πεδίο εφαρμογής, εφαρμόστε αυστηρά σε κάθε μία πριν από την έκπτυξη των οφθαλμών όπως αναγράφεται σε στον παραπάνω πίνακα, για να αποφύγετε τις επιπτώσεις φυτοτοξικότητας που θα επιτύχετε την καλύτερη αποτελεσματικότητα. / Σε νέες ποικιλίες πραγματοποιήστε μια εφαρμογή μικρής κλίμακας, σε ορισμένα φυτά πριν κάνετε εκτεταμένες εφαρμογές. / **Τηρείτε αυστηρά τόσο τις καλλιέργειες όσο και τις ενδείξεις που καθορίζονται στην ετικέτα. Η μη τήρηση των ενδείξεων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη βιολογικής δραστηριότητας του SIBERIO, φυτοτοξικότητα και μείωση της παραγωγής.**

Αυτό το λίπασμα περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να απελευθερώσει αμμωνία και να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Χρησιμοποιήστε το κλειστό και μακριά από παιδιά, κατοικίδια, τρόφιμα και ζωοτροφές. Η Εταιρεία ευχαρίστησε τη σύνθεση τη μορφή και το περιεχόμενο. Χρηρήση εδύνηται για ήμελες (έλλειψη αποτελεσματικότητας, καταστροφή μίγματος κ.λπ.) που προκαλούνται από μερική ή ολική μη τήρηση των οδηγιών. Επικοινωνήστε με την εταιρεία ή τον διανομέα της εταιρείας που αναγράφεται στην ετικέτα για ειδικότερες συστάσεις και αποφύγετε την υπέρβαση των συνιστώμενων δόσεων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ



MADE IN ITALY



χαμηλές περιεκτικότητες σε χλώριο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΝΑΚΙΝΗΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
BIOGARD GREENE E.P.E.
Κέρκυρας 62 & Κονιτσης 38, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. 210 6460700
Info@biogard.gr - www.biogard.gr



E8861B

Καλλιέργειες	Δόση Εφαρμογής* L/ha	Στάδιο εφαρμογής και συστάσεις**	ΑΞΙΩΣΕΙΣ
Επιτραπέζιο Αμπέλι	64	Από 60 - 45 ημέρες πριν την έκπτυξη των οφθαλμών στο υπέργειο μέρος	Ποιотικά χαρακτηριστικά: Ενίσχυση της βλάστησης
Ακτινιδιά	64	Από 60 - 45 ημέρες πριν την έκπτυξη των οφθαλμών στο υπέργειο μέρος	
Κερασιά	60-80	Από 60 - 45 ημέρες πριν την έκπτυξη των οφθαλμών στο υπέργειο μέρος	
Βερικοκιά	64	Από 60 - 45 ημέρες πριν την έκπτυξη των οφθαλμών στο υπέργειο μέρος	
Δαμασκηλιά	64	Από 60 - 45 ημέρες πριν την έκπτυξη των οφθαλμών στο υπέργειο μέρος	
Μηλιά	60	Από 60 - 45 ημέρες πριν την έκπτυξη των οφθαλμών στο υπέργειο μέρος	

*Το προϊόν πρέπει να αραιώνεται τουλάχιστον σε ψεκαστικό διάλυμα 80 L/στρέμμα. Για τις κερασιές και τις μηλιές αραιώστε τουλάχιστον σε ψεκαστικό διάλυμα 1000 λίτρα/στρέμμα.

Να γίνεται διαχείριση σύμφωνα με τις καιρικές και τις αγρονομικές συνθήκες.

**Ανάλογα με την καλλιέργεια, τη μέθοδο εφαρμογής, την τοποθεσία κ.λπ., ο ρυθμός εφαρμογής και ο όγκος νερού μπορεί να διαφέρουν.

Για άλλες πολυτελείς καλλιέργειες επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πιο συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή.

SIBERIO

Περιέχει αιθοξυλιωμένη δεκυλ-αλκοόλη και ασβεστούχο νιτρική αμμωνία

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Δηλώσεις προφυλάξεων:

- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

UFI: 8030-NOPU-U00V-TKMXX

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

GREEN HAS ITALIA S.p.A

Corso Alba 85/89 - 12043 Canale (CN) - ITALY

Tel +39 0173 95 433 - Fax +39 0173 97 94 64

info@greenhasgroup.com

www.greenhasgroup.com

Υγρό Διάλυμα

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ (βάρος/όγκος)

15 L ≈ 18,6 kg

