

VIT-ORG VG

ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
NPK 2-0-6
Υγρό εναιώρημα

Ομάδα λιπασμάτων Β΄: Οργανικά λιπάσματα κύριων και δευτερευόντων στοιχείων με ή χωρίς ιχνοστοιχεία.
Αριθ. Άδειας κυκλοφορίας Υπ. Αγροτ. Ανάπτ.&Τροφίμων: 14

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N)	2% β/β ή (2,6% β/ο)
ΚΑΛΙΟ (Κ ₂ O) διαλυτό στο νερό	6% β/β ή (7,8 β/ο)
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)	15% β/β ή (19,5% β/ο)

Ειδικό βάρος (20°C): 1,30 γρ./κ.εκ.
pH: 7 ± 0,5 (1% υδατ. διαλύματος)
Ηλεκτρ. αγωγιμότητα: 400 μS/cm (υδατ. διαλύματος 1 g/l)



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 2018/848 ΚΑΙ 2021/1165.

Το VIT-ORG VG είναι οργανικό υγρό λίπασμα νέου τύπου, που ενεργοποιεί βιολογικά το έδαφος.

Περιέχει ένα ενεργό μείγμα 100% φυτικής προέλευσης πολυσακχαριτών, που προσφέρουν υψηλή συνδυασμένη συγκέντρωση αζώτου και καλίου σε οργανική μορφή καθώς και ιδιαίτερα πλούσια περιεκτικότητα σε αμινοξέα (10%) και γλυκίνη, μπεταΐνη (7%) που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση κάθε είδους καταπόνησης των φυτών. Εφαρμοζόμενο στο έδαφος ενεργοποιεί τη μικροχλωρίδα, βελτιώνει τη φυσική δομή του, βοηθάει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά, διατηρεί την περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και μειώνει την αρνητική επίδραση από παράγοντες αβιοτικής καταπόνησης και αλατότητας.

Όταν εφαρμόζεται διαφυλλικά, επιδρά και επιταχύνει τις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών και βοηθά στην αντιμετώπιση της καταπόνησης από διάφορες αιτίες.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΦΥΛΛΟΨΕΚΑΣΜΟ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οπωροφόρα δέντρα, αμπέλια, εσπεριδοειδή, ελιές, τροπικά φρούτα	1-2 lt/στρέμμα	3-4 lt/στρέμμα	2-5 εφαρμογές από την έναρξη της βλαστικής ανάπτυξης μέχρι την ωρίμανση. Για την καλύτερη απόδοση μέσω του συστήματος άρδευσης, να εφαρμόζονται τουλάχιστον 5-6 lt/στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο
Λαχανικά θερμοκηπίου	2-3 lt/στρέμμα	200 ml/100 lt ψεκ. διαλύματος	
Λαχανικά αγρού και βιομηχανικές καλλιέργειες	1-2 lt/στρέμμα	200 – 400 ml/στρέμμα	2-5 εφαρμογές στην καλλιεργητική περίοδο
Εκτατικές καλλιέργειες	-	200-400 ml/στρέμμα	Εφαρμογές στην περίοδο της έντονης ανάπτυξης
Φυτώρια, Άνθη και καλλωπιστικά	1,5-2 lt/στρέμμα	150-250 ml/στρέμμα	Κατά την μεταφύτευση ή μετά από κλάδεμα και επανάληψη κάθε 15-20 μέρες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο κατά τα 2/3 με νερό. Ανακινούμε το σκεύασμα καλά και προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Το προϊόν μπορεί να συνδυαστεί με τα περισσότερα φυτοθρεπτικά σκευάσματα. Συνιστάται να προηγείται πάντοτε δοκιμή συνδυαστικότητας πριν από την εφαρμογή. **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Το προϊόν διατηρείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C - 50°C. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες κάτω του 0°C. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:** Αποφύγετε τους ψεκασμούς τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Για ευαίσθητες καλλιέργειες ή ποικιλίες, μην εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά, κατοικίδια, τρόφιμα και ζωοτροφές. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Η Εταιρεία ευγνώσκει τη σύνθεση, τη μορφή και το περιεχόμενο. Ο χρήστης ευθύνεται για ζημιές (έλλειψη αποτελεσματικότητας, κατακρήμνιση μίγματος κ.λπ.) που προκαλούνται από μερική ή ολική μη τήρηση των οδηγιών.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: GREEN HAS ITALIA S.p.A.
Corso Alba 85/89 - 12043 Canale (CN) - ITALY
Tel +39 0173 95 433 - Fax +39 0173 97 94 64
info@greenhasgroup.com
www.greenhasgroup.com



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.
Κέρκυρας 62 & Κονίτσης 38,
Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25
Τηλ. 210-6460700
info@biogard.gr

ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

MADE IN ITALY



E5250C

Περιεχόμενο:

20 L ≈ 26 kg