

Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής: ΦΡΑΟΥΛΑ (Y+Θ), ΛΑΧΑΝΙΚΑ ((Y+Θ): ΡΙΖΩΔΗ (Παντζάρι, Καρότο, Ρίζες μαϊντανού, Ραπανάκι, Γλυκοπατάτα, Γογγύλι), ΒΟΛΒΩΔΗ (Σκόρδο, Κρεμμύδι), ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα), ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθες), ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ (Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο Βρυξελλών, Λάχανο σαλάτας, Ελαιοκράμβη, Γογγυλοκράμβη), ΦΥΛΛΩΔΗ (Μαρούλι, Σπανάκι, Αντίδι, Σέλερι, Μαϊντανός), ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (Σπαράγγι, Αγκινάρα, Σέλινο, Μάραθο, Πράσο), ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ, ΒΟΤΑΝΑ (Φασκόμυλο, Δενδρολίβανο, Θυμάρι, Μέντα, Άνηθος), ΨΥΧΑΝΘΗ (Φασόλια, Φακές, Μπιζέλια, Αράπικο φιστίκι), ΠΑΤΑΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ, ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (Y+Θ), ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ.

Στόχοι: Pythium spp., Phytophthora capsici, Rhizoctonia spp., Verticillium spp.,

Δόσεις σκευάσματος, τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

α) 500 γρ/στρέμμα (max), 100 γρ/100 λίτρα διαλύματος, Όγκος διαλύματος: 500 λίτρα/στρέμμα, για εφαρμογή εδάφους (διαβροχή εδάφους ή μέσω των συστημάτων άρδευσης).

β) 500-1000 γρ./m³, όγκος διαλύματος: 50 λίτ./m³, για ενσωμάτωση σε φυτικά υποστρώματα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- 1) Για τα φυτικά υποστρώματα ο όγκος νερού είναι 50 λίτρα/m³
- 2) Στάδιο ανάπτυξης και εποχή: Πριν από τη σπορά ή τη μεταφύτευση

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Μη εφαρμόσιμο

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: 0 ημέρες
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: 0 ημέρες
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 0 ημέρες

Τρόπος εφαρμογής:

- Εφαρμόζεται στο θερμοκήπιο και στην ύπαιθρο.
- Εφαρμογή στο έδαφος με διαβροχή του εδάφους ή μέσω των συστημάτων άρδευσης ή στο φυτικό υπόστρωμα με ενσωμάτωση.

Τρόπος παρασκευής του διαλύματος:

Η απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναμιγνύεται με νερό σε ένα κάδο υπό συνεχή ανάδευση. Η ανάδευση να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.

Καθαρισμός των συσκευών εφαρμογής:

Αμέσως μετά τη χρήση, ξεπλύντε καλά αντλίες, σωλήνες και ακροφύσια τρεις φορές με νερό. Ξεπλύντε καλά τα τοιχώματα των δοχείων χρήσης αδειάζοντας τα κατάλοιπα στους χώρους χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας καταστρέφονται και απορρίπτονται σε κατάλληλους χώρους ανακύκλωσης.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν oxadiazon και pendimethaline και με προϊόντα που έχουν ως βάση τις ουσίες azoxystrobin, chlorothalonil, iprodione, mancozeb, penconazole, thiram και tolcophos-methyl.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του απараβίαστη συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόμενο, ξηρό και δροσερό (με θερμοκρασίες έως 30°C). Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για εννέα (9) μήνες σε θερμοκρασία δωματίου από την ημερομηνία παρασκευής του ή για τουλάχιστο δώδεκα (12) μήνες σε κανονική ψύξη στο ψυγείο.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: HM/NIA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: HM/NIA ΛΗΞΗΣ: } Αναγράφονται πάνω στην συσκευασία

XEDAVIR

Βρέξιμη σκόνη (WP)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Trichoderma asperellum strain TV-1 2,8% B/B
Βοηθητικές ουσίες: 97,2% B/B

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο εδάφους με βάση το μύκητα Trichoderma asperellum στέλεχος TV1, ο οποίος είναι ένας ανταγωνιστής μύκητας με αυξημένη ανταγωνιστικότητα και ικανότητα σχηματισμού αποικιών στο περιβάλλον και στα υποστρώματα ανάπτυξης, καθώς και ικανότητα υπεράσπισης των εδαφικών πόρων σε αντίθεση με άλλους μικροοργανισμούς του εδάφους.

Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδυασμένα με μια αυξημένη προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές εδαφολογικές - κλιματολογικές συνθήκες τον καθιστούν ιδεώδη ανταγωνιστή στο έδαφος όπου ασκεί δράση καταστολής και περιορισμού των παθογόνων που είναι υπαίτια για τις σήψεις των ριζών όπως οι μύκητες Pythium spp., Phytophthora capsici, Rhizoctonia solani και Verticillium spp.

Το στέλεχος TV1 απαντάται ευρέως στη φύση (και στο έδαφος) και δεν είναι γενετικά τροποποιημένο.

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

ΑΑΔΑ Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης
& Τροφίμων: 60555/11-10-2016

Κάτοχος της έγκρισης:



XEDA INTERNATIONAL S.A.
1397 R.N. 7, ZAC la Crau,
13670 SAINT-ANDIOL - ΓΑΛΛΙΑ

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:



BIOGARD GREECE E.P.E.
Λεωφ. Κηφισίας 18, 115 26 Αθήνα
Τηλ. 210-6460700

**Καθ. Βάρος
1 kg**

Δηλώσεις προφύλαξης:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Φοράτε συσκευή ατομικής προστασίας της αναπνοής (φίλτρο P3).
- Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 30 °C. Διατηρείται δροσερό.
- Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προφυλάξεις για τους χειριστές:

Συνιστάται η χρήση προστατευτικής ενδυμασίας και γαντιών κατά το χειρισμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά και ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός επιμένει.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε την περιοχή που έχει έλθει σε επαφή με το προϊόν με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον πάσχοντα σε καθαρό αέρα.
- Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλείτε εμετό, καλέστε ένα γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 77 93 777**